

科名 外科
 対象疾患名 食道がん
 プロトコール名 FP療法

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	...	29
1	CV	メイン	ソルアセトD	500mL	10° -18°	↓	↓							
2	CV	メイン	ソルデム3A	500mL	18° -2°	↓	↓							
3	CV	メイン	ソルデム3A	500mL	2° -10°		↓	↓						
4	CV	メイン	ソルアセトD	500mL	10° -22°			↓						
5	CV	メイン	ソルデム3A	500mL	22° -10°			↓						
6	CV	メイン	ソルアセトD	500mL	10° -10°				↓	↓	↓	↓		
7	CV	側管1	フルオロウラシル 生食	800mg/m ² 1000mL	11° -11°		↓	↓	↓	↓	↓			
8	CV	側管2	ラシックス 生食	10mg 50mL	10° 10分かけて		↓	↓						
9	CV	側管2	ラシックス 生食	10mg 50mL	18° 10分かけて	↓	↓							
10	CV	側管2	パロノセトロンバッグ デキサート	0.75mg 19.8mg	10° 30' 30分かけて		↓							
11	CV	側管2	シスプラチン 生食	80mg/m ² 500mL	11° -13° 2hrかけて		↓							
12	CV	側管2	デキサート 生食	13.2mg 50mL	6° 30分かけて			↓	↓	↓	↓			

★1クール＝29日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

フルオロウラシルによる静脈炎予防のためCVポートやピックカテーテル等を挿入して行う。輸液ポンプ使用可

24hr尿量チェック要(指示有)