

科名 外科 外-57(a)
 対象疾患 大腸癌(治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌)
 プロトコール名 SOX

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	14	...	21
1	点滴注 CV	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓				
2	点滴注 CV	側管	グラニセトンバッグ デキサート注 ガモファー注 ネオレスタール注	1mg 9.9mg 20mg 10mg	30分かけて	↓				
3	点滴注 CV	側管	又は パロノセトンバッグ デキサート ガモファー注 ネオレスタール注	0.75mg 9.9mg 20mg 10mg	30分かけて					
4	点滴注 CV	側管	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 250mL又は500mL	2時間かけて ルートごと変更	↓				

内服 S-1 1回40mg~60mgを1日2回 d1~d14投与、d15~d21は休薬

★1クール=21日

~MEMO~

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2~4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

・S-1は 14日間投与、7日間休薬

・S-1は 体表面積(BSA)<1.25m²:40mg/回

1.25m²≤BSA<1.5m²:50mg/回

BSA≥1.5m²:60mg/回

・ オキサリプラチンは必ず5%ブドウ糖液で希釈。(薬効がおちる。)

・ オキサリプラチンのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。(現在は

4~16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)

・ デキサートは6.6、9.9、13.2、19.8mgで選択可。

S-1 plus oxaliplatin versus capecitabine plus oxaliplatin for first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer:a randomised,non-inferiority phase3 trial
 Lancet Oncology 13(11);2012:1125-1132