科名　　外科　　外ー57(b)

対象疾患　　大腸癌（治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌）

プロトコール名　　SOX(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ・・・ 14 ・・・ 21
1	点滴注 CV	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓
2	点滴注 CV	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓
			アロカリス	235mg		
			デキサート注	9.9mg		
			ファモチジン注	20mg		
			ネオレスタール注	10mg		
			又は			
3	点滴注 CV	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて	
			アロカリス	235mg		
			デキサート	9.9mg		
			ファモチジン注	20mg		
			ネオレスタール注	10mg		
4	点滴注 CV	側管	オキサリプラチン注	130mg/m^2	2時間かけて	↓
			5%ブドウ糖液	250mL又は500mL	ルートごと変更	
	内服	S－1	1回40mg～60mgを1日2回	d1～d14投与、d15～d21は休薬		

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル3（30%以上90%未満）

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg（8錠）を内服する。

・S－1は　14日間投与、7日間休薬

・S－1は　体表面積（BSA）＜1.25m^2：40mg/回

1.25m^2≦BSA＜1.5m^2：50mg/回

BSA≧1.5m^2：60mg/回

・　オキサリプラチンは必ず5%ブドウ糖液で希釈。（薬効がおちる。）

・　オキサリプラチンのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。（現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10）

・　デキサートは6.6、9.9、13.2、19.8mgで選択可。

S-1 plus oxaliplatin versus capecitabine plus oxaliplatin for first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer:a randomised,non-inferiority phase3 trial
Lancet Oncology 13(11);2012:1125-1132