

科名 外科 外科-61
 対象疾患 食道癌
 プロトコール名 high dose FP

| Rp | 形態 | ルート | 薬剤名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 22 |
|----|-----|-----|----------------------------------|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン | 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 1000mL 1000mL 10mL | 22時から10時 ※アリメバッグ | ↓ | | | | | | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート注 | 0.75mg 235mg 9.9mg | 9時30分から10時 | ↓ | | | | | | | |
| 3 | 点滴注 | 側管 | デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 50mL | 9時30分から10時 | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| 4 | 点滴注 | 側管 | シスプラチン注 生理食塩液 | 80mg/m ² 250mL | 10時から12時 | ↓ | | | | | | | |
| 5 | 点滴注 | メイン | 5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 400mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL | 10時から22時 ※アリメバッグ | ↓ | | | | | | | |
| 6 | 点滴注 | メイン | 5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 400mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL | 22時から~10時 ※アリメバッグ | ↓ | | | | | | | |
| 7 | 点滴注 | メイン | 5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 800mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL | 10時から10時 ※アリメバッグ | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 8 | 点滴注 | 側管 | マンニトールS | 300mL | 10時から12時 | ↓ | | | | | | | |

★1クール=22日間

~MEMO~

催吐レベル4(90%以上)