

科名 外科 外科—65(b)

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 **ベクティビックス+FOLFIRI(アロカリス併用)**

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	14
1	CVポート	メイン2-①	生理食塩水	250mL	ベクティビックス終了後1時間まで残ハキ可	↓			
2	CVポート	側管②	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート注	0.75mg 235mg 4.95mg	30分かけて	↓			
3	CVポート	側管②	又は グラニセトロンバッグ アロカリス デキサート注	1mg 235mg 4.95mg	30分かけて	↓			
4	CVポート	側管③	ベクティビックス 生理食塩液	6mg/Kg 100mL	60分以上かけて 要フィルター	↓			
			ルートキープにて1時間休薬			↓			
5	CVポート	メイン2-②	レボホリナート注 生理食塩液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	2時間かけて	↓			
6	CVポート	側管	カンプト注 生理食塩液	150 or 180mg/m <sup>2</sup> 250mL	2時間かけて	↓			
7	CVポート	側管	5-FU注 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 50mL	5~10分以内で	↓			
8	CVポート	メイン	5-FU注 生理食塩液	2400mg/m <sup>2</sup> mL <sup>*</sup>	46時間持続静注 バクスターインフューザーSV2.5	→			

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

★1クール=14日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

DLT: 皮膚障害、下痢

【注1】インラインフィルター(0.2または0.22ミクロン)を使用すること

【注2】ベクティビックスは生食で希釈。

【注3】2回目以降に重度のinfusion reactionを発現することもある。

【注4】ベクティビックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。

【注5】ベクティビックス投与開始前に皮膚科依頼をし、皮膚障害のコントロールについて連携を図ること。