

科名 外科 外科-69
 対象疾患名 乳がん
 プロトコール名 weekly nab-PTX

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	28
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	デキサート注	6.6mg	30分かけて	↓		↓		↓		
			生食	50mL								
	or											
	点滴注	側管	グラニセロンバッグ	3mg	30分かけて	↓		↓		↓		
3	点滴注	側管	アブラキサン注	100mg/m ²	30分かけて 壊死性抗がん剤	↓		↓		↓		
			生食	1Vに付20mL	小児用点滴ルート (JY-ND363PL)を使用 フィルター使用不可							

★1クール＝28日

～MEMO～

- ・ 催吐レベル2(10～30%)

〈アブラキサン〉

本剤は特定生物由来製品（血液製剤）のため、同意書およびLot番号管理が必要である。

他の薬剤との配合または同じ静注ラインでの同時注入は避ける。

5mg/mLとなるように調製し、総投与量をラベルに赤字で記載する。

投与時に注射ラベルで総投与量を確認し、小児科用点滴ルート(JY-ND363PL)を使用。

投与量が少ないためルート内は出来るだけ入れきる。(目安: ルートの半分程度)

その際、滴下速度はそのままにする。(クレンメは全開にしない。)

インラインフィルターを使用しない。

投与前後にルートキープの生食でフラッシュ。