

科名 外科 外科71

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発胃がん

プロトコール名 CDDP+ゼローダ(XP)療法

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	...	8	...	15	22
1	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 アリメバッグで	↓							
2	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00～22:00 アリメバッグで	↓							
3	点滴注	側管1	グラニセロンバッグ デキサート 又は パロノセロンバッグ デキサート	1mg 9.9mg 0.75mg 9.9mg	30分かけて 10:00～10:30	↓							
4	点滴注	側管2-①	シスプラチン 生食	80mg/m ² 500mL	2時間かけて 10:30～12:30	↓							
5	点滴注	側管2-②	マンニトールS	300mL	6時間かけて 10:30～16:30	↓							
6	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 アリメバッグで	↓							
7	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00～22:00 アリメバッグで			↓	↓	↓			
8	点滴注	側管	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて 10:00から10:30			↓	↓	↓			
内服 ゼローダ1回1000mg/m ² を1日2回 d2朝食後～d15夕食後投与、d16朝食後～d22は休薬													

★1クール＝22日（day1はハイドレーション）

～MEMO～

催吐レベル4（90%以上）

イメドカプセルを内服する。day2は9:30に125mgを1カプセル、day3,4は午前中に80mgを1カプセル

ゼローダは14日間内服7日間休薬

ゼローダ1日2回内服、1回の投与量

体表面積(BSA) < 1.36m²は1200mg/回(4Tab)1.36m² ≤ BSA < 1.66m²は1500mg/回(5Tab)1.66m² ≤ BSA < 1.96m²は1800mg/回(6Tab)BSA ≥ 1.96m²は2100mg/回(7Tab)