科名　消化器科　外科77

対象疾患名　治癒切除不能な進行・再発胃がん

プロトコール名　TS-1+CDDP療法

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	・・・	7	8	9	10	11	・・・	15	35
1	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 アリメバッグで			↓							
2	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00～22:00 アリメバッグで				↓						
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 9.9mg	10:00～10:30				↓						
4	点滴注	側管2-①	シスプラチン 生食	60mg/㎡ 500mL	2時間かけて 10:30～12:30				↓						
5	点滴注	側管2-②	マンニットールS	300mL	2時間かけて 10:30～12:30				↓						
6	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 アリメバッグで				↓						
7	点滴注	メイン	生食 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	10:00～22:00 アリメバッグで					↓	↓	↓			
8	点滴注	側管	デキサート 生食	3.3mg 50mL	30分かけて 10:00から10:30					↓					
9	点滴注	側管	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて 10:00から10:30						↓	↓			
	内服	TS-1を1回40mg/㎡を1日2回　d1朝食後～d21夕食後投与、d22朝食後～d35は休薬													

★1クール＝35日（day7はハイドレーション）

～MEMO～

催吐レベル4（90%以上）

TS-1は21日間内服14日間休薬

TS-1は1日2回内服、**1回**の投与量

体表面積（BSA）＜1.25㎡は40mg/**回**

1.25㎡≦BSA＜1.5㎡は50mg/**回**

BSA≧1.5㎡は60mg/**回**

Lancet Oncol 9:215-2212,2008