

科名 外科
 対象疾患 HER2陽性転移再発乳癌
 プロトコール名 HP初回

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	8	...	15	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓						
2	点滴注	側管	パージェタ	840mg	60分かけて	↓							
			生食	250mL									
			60分休薬										
3	点滴注	側管	トラスツズマブ注	8mg/Kg	90分かけて	↓							
			注射用水	7.2mL									
			生食	250mL									

★1クール＝22日

～MEMO～

催吐レベル1(10%未満)

<パージェタ>

初回840mgを60分以上、二回目以降は420mgを30分以上かけて

初回投与の13%にインフュージョンリアクション。投与中または投与開始後24時間は慎重に観察

投与終了後、初回投与時に60分ルートキープで休薬、経過観察を行い、2クール目以降も慎重に観察

通常の患者は12週ごと、無症候性心機能障害患者は6～8週ごと心機能を評価

<トラスツズマブ>

初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg。初回90分で忍容性があれば2回目以降30分。ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性があれば30分。

禁忌: アンスラサイクリン系との併用(心毒性の増強)

初回投与の40%にインフュージョンリアクションが認められる。投与開始後2時間は慎重に観察

三か月毎に心エコーで心機能を評価

最終投与から6週以上経過した場合は初回投与量(8mg/kg)より再開する。