

科名 外科 外科—86
 対象疾患 食道癌
 プロトコール名 FP+RT

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	...	29
1	点滴注	メイン	フィジオ140 5%ブドウ糖	1000mL 1000mL	22時から10時 ※アリメバッグ	↓							
2	点滴注	側管	グラニセロンバッグ アロカリス	1mg 235mg	9時30分から10時	↓							
3			デキサート注 または パロノセロンバッグ アロカリス	9.9mg 0.75mg 235mg									
4	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9時30分から10時			↓	↓	↓			
5	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	10時から12時	↓							
6	点滴注	メイン	5FU フィジオ140 5%ブドウ糖	500mg/m ² 1000mL 1000mL	10時から22時 ※アリメバッグ	↓							
7	点滴注	メイン	5FU フィジオ140 5%ブドウ糖	500mg/m ² 1000mL 1000mL	22時から～10時 ※アリメバッグ	↓							
8	点滴注	メイン	5FU フィジオ140 5%ブドウ糖	1000mg/m ² 1000mL 1000mL	10時から翌10時 ※アリメバッグ			↓	↓	↓			
9	点滴注	側管	マンニトールS	300mL	10時から12時	↓							
放射線照射				2Gy/fr/day	合計60Gy								

★1クール＝29日間

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

2クール施行。

部分奏功以上が得られ、完全奏功が望める場合には化学療法のみ2クール追加する。