

科名 外科
 対象疾患 乳癌
 プロトコール名 HER+DOC+CPA(2回目以降)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ... 8 ... 21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓
2	点滴注	メイン	トラスツズマブ注 注射用水 生食	6mg/Kg 7.2mL 250mL	初回90分。以降忍容性があれば30分。 ただし、初回にインフュージョンリアクションあ れば2回目60分。以降忍容性があれば30分。	↓
3	点滴注	側管	デキササート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	30分かけて	↓
4	点滴注	側管	ネオレスタール 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓
5	点滴注	側管	ドセタキセル 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	60分かけて 壊死性抗がん剤	↓
6	点滴注	側管	エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 100mL	30分かけて	↓

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル2(10%以上30%未満)

<トラスツズマブ>

初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg。初回90分で忍容性があれば2回目以降30分。ただし、初回にインフュージョンリアクションがあれば2回目60分。以降忍容性があれば30分。

禁忌: アンスラサイクリン系との併用(心毒性の増強)

初回投与の40%にインフュージョンリアクションが認められる。投与開始後2時間は慎重に観察

三か月毎に心エコーで心機能を評価

最終投与から6週以上経過した場合は初回投与量(8mg/kg)より再開する。

<タキソテール>

タキソテールの溶解は添付溶解液を使用せず、生食or5%Gで行うこと

アレルギー好発時期:初回,2回目

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない

末梢静脈投与の場合、薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にする
 (1hrで滴下する場合126滴/分)