

科名 外科

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発大腸癌

プロトコール名 mXELIRI<ゼローダ投与量注意>

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ デキサート	0.75mg 9.9mg	30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	カンプト 生食	150mg/m ² 500mL	90分以上かけて	↓						

内服 ゼローダ1回800mg/m²を1日2回 day1-14投与 day15-21休薬

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～4にデキサメタゾン錠を朝,昼食後に4mg/回

<カンプト>

UGT1A1の遺伝子多型検査を実施し、UGT1A1*6UGT1A1*28のホモ接合体、ヘテロ接合体をもつ患者には150mg/m²に減量。(当院では安全性を考慮し、全例150mg/m²とする。)

<ゼローダ>

ゼローダは14日間内服7日間休薬

ゼローダ1日2回内服、1回の投与量

体表面積(BSA)<1.31m²は900mg/回(3Tab)1.31m²≤BSA<1.69m²は1200mg/回(4Tab)1.69m²≤BSA<2.07m²は1500mg/回(5Tab)BSA≥2.07m²は1800mg/回(6Tab)