

科名 外科

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 RAM+FOLFIRI(アロカリス併用)

| Rp                     | 形態    | ルート    | 薬品名                                     | 投与量                                  | 時刻・コメント                                            | 1 | 2 | ... | 14 |
|------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|-----|----|
| 1                      | CVポート | メイン3-① | 生食                                      | 500mL                                | ルートキープ<br>残破棄可                                     | ↓ |   |     |    |
| 2                      | CVポート | 側管②    | パロノセトロンバッグ<br>アロカリス<br>デキサート<br>ネオレスタール | 0.75mg<br>235mg<br>4.95mg<br>10mg    | 30分かけて                                             | ↓ |   |     |    |
| 3                      | CVポート | 側管③    | サイラムザ<br>生理食塩水                          | 8mg/kg<br>250mL                      | 初回60分、2回目以降忍容性が良好であれば30分<br>2回目まで1時間休薬要。全量250mLとする | ↓ |   |     |    |
| サイラムザ投与時はルートキープにて1時間休薬 |       |        |                                         |                                      |                                                    |   |   |     |    |
| 4                      | CVポート | メイン3-② | レボホリナート注<br>生理食塩液                       | 200mg/m <sup>2</sup><br>250mL        | 2時間かけて                                             | ↓ |   |     |    |
| 5                      | CVポート | 側管④    | カンプト注<br>生理食塩液                          | 150 or 180mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 2時間かけて                                             | ↓ |   |     |    |
| 6                      | CVポート | 側管⑤    | フルオロウラシル<br>生理食塩液                       | 400mg/m <sup>2</sup><br>50mL         | 全開で                                                | ↓ |   |     |    |
| 7                      | CVポート | メイン3-③ | フルオロウラシル<br>生理食塩液                       | 2400mg/m <sup>2</sup><br>mL※         | 46時間持続静注<br>バクスターインフューザーSV2.5                      | → |   |     |    |

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

1クール＝14日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

&lt;サイラムザ&gt;

投与前後生食フラッシュ蛋白質透過型フィルター(0.2または0.22ミクロン)(回路名:JY-PF340P52)使用

1回目、2回目はインフュージョンリアクションの観察のため投与後1時間ルートキープにて休薬する。3回目以降は省略可

用量規定因子:高血圧、蛋白尿