科名　外科

対象疾患名　大腸癌

プロトコール名　BEV+TAS102

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	・・・	28
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓														↓		
2	点滴注	側管	ベバシズマブ 生食	5mg/kg 100mL	医師の指示通り	↓														↓		
3	内服		ロンサーフ　1回35mg/㎡を1日2回朝、夕食後			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓					

★1クール＝28日

～MEMO～

催吐レベル2（10%以上30%未満）

＜ベバシズマブ＞

創傷治癒遅延の作用により術後28日以内の投与不可□

投与速度:初回90分,忍容性良好であれば60分,30分まで短縮可

投与期間中は投与回数が増えるほど高血圧の出現頻度が高くなるため定期的に血圧を測定すること。

＜ロンサーフ＞

5日間連続内服したのち2日間休薬をし、これを2回繰り返したのち14日間休薬する。

1日2回内服、1回の投与量

体表面積＜1.07㎡は35mg/回(70mg/日)

1.07≦BSA＜1.23は40mg/回（80mg/日）

1.23≦BSA＜1.38は45mg/回（90mg/日）

1.38≦BSA＜1.53は50mg/回（100mg/日）

1.53≦BSA＜1.69は55mg/回（110mg/日）

1.69≦BSA＜1.84は60mg/回（120mg/日）

1.84≦BSA＜1.99は65mg/回（130mg/日）

1.99≦BSA＜2.15は70mg/回（140mg/日）

BSA≧2.15は75mg/回（150mg/日）