

科名 外科

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 ザルトラップ+FOLFIRI

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	14
1	CVポート	メイン3-①	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓			
2	CVポート	側管①	パロノセトロンバッグ デキサート	0.75mg 9.9mg	30分かけて	↓			
3	CVポート	側管②	ザルトラップ 生理食塩水	4mg/kg 100mL	1時間かけて 専用ルート「JY-PF340P52」使用	↓			
4	CVポート	メイン3-②	レボホリナート注 生理食塩液	200mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
5	CVポート	側管③	カンプト注 生理食塩液	150mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
6	CVポート	側管④	フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50mL	全開で	↓			
7	CVポート	メイン3-③	フルオロウラシル注 生理食塩液	2400mg/m ² mL※	46時間持続静注 バクスターインフューザーポンプSV2.5	→			

※生理食塩液の量はフルオロウラシルの量により決定する。

1クール＝14日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

<ザルトラップ>

投与前後生食フラッシュ蛋白質透過型フィルター(0.2または0.22ミクロン)(回路名:JY-PF340P52)使用

創傷治癒遅延の作用により術後28日以内の投与不可口

投与期間中は定期的に血圧を測定すること。