科名　　外科

対象疾患名　　治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名　ザルトラップ+FOLFIRI（アロカリス併用）

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	・・・	14
1	CVﾎﾟｰﾄ	メイン3-①	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓			
2	CVﾎﾟｰﾄ	側管②	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 4.95mg	30分かけて	↓			
3	CVﾎﾟｰﾄ	側管③	ザルトラップ 生理食塩水	4mg/kg 100mL	1時間かけて 専用ルート「JY-PF340P52」使用	↓			
4	CVﾎﾟｰﾄ	メイン3-②	レボホリナート注 生理食塩液	200mg/㎡ 250mL	2時間かけて	↓			
5	CVﾎﾟｰﾄ	側管④	カンプト注 生理食塩液	150mg/㎡ 250mL	2時間かけて	↓			
6	CVﾎﾟｰﾄ	側管⑤	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/㎡ 50mL	全開で	↓			
7	CVﾎﾟｰﾄ	メイン3-③	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/㎡ mL※	46時間持続静注 バクスターインフューザーポンプSV2.5	→			

※生理食塩液の量はフルオロウラシルの量により決定する。

1クール＝14日

～MEMO～

催吐レベル3（30%以上90%未満）

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg（8錠）を内服する。

＜ザルトラップ＞

投与前後生食フラッシュ蛋白質透過型フィルター（0.2または0.22ミクロン）（回路名:JY-PF340P52)使用

創傷治癒遅延の作用により術後28日以内の投与不可□

投与期間中は定期的に血圧を測定すること。

Addition of Aflibercept to Fliorouracil,Leucovorin,andIrinotecan Improves Survival in PhaseⅢRandomized Trial in patients With Metastatic Colorectal Cancer Previously Treated With an Oxaliplatin-Based Regimen
J Clin Oncol 30:3499-3506