

科名 外科

対象疾患 HER2陽性転移再発乳癌

プロトコール名 HP+ハラヴェン初回

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	9	...	16	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓		↓				
2	点滴注	側管	パージェタ	840mg	60分かけて	↓							
			生食	250mL									
			60分休薬										
3	点滴注	側管	トラスツズマブ注	8mg/kg	90分かけて		↓						
			注射用水	7.2mL									
			生食	250mL									
4	点滴注	側管	ハラヴェン	1.4mg/m ²	全開で(10分以内)		↓		↓				
			生食	30mL									

★1クール＝22日

～MEMO～

催吐レベル2(10%以上30%未満)

<パージェタ>

禁忌: アンスラサイクリン系との併用(心毒性の増強)

初回投与の40%にインフュージョンリアクションが認められる。投与開始後2時間は慎重に観察

三か月毎に心エコーで心機能を評価

最終投与から6週以上経過した場合は初回投与量(8mg/kg)より再開する。

<トラスツズマブ>

初回8mg/kgを90分以上、二回目以降は6mg/kgで30分以上かけて

初回投与の40%にインフュージョンリアクション。投与開始後2時間は慎重に観察

三か月毎に心エコーで心機能を評価

<ハラヴェン>

投与にあたっては、投与開始基準、減量基準を参考に必要に応じて、投与を延期、減量または休薬すること。

減量を行なう際、次の用量を考慮すること。

減量前の投与 → 減量後の投与量

1.4mg/m² → 1.1mg/m²1.1mg/m² → 0.7mg/m²0.7mg/m² → 投与中止を検討