

科名 外科

対象疾患名 切除不能・再発食道癌

プロトコール名 FOLFOX(切除不能・再発食道癌)(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	14
1	CVポート	メイン3-①	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓			
2	CVポート	側管②	パロノセトロンバッグ アロカリス ファモチジン ネオレスタール デキサート	0.75mg 235mg 20mg 10mg 4.95mg	30分かけて	↓			
3	CVポート	メイン3-②	レボホリナート注 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
4	CVポート	側管③	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
5	CVポート	側管④	フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	400mg/m ² 50mL	急速静注 3~5分	↓			
6	CVポート	メイン3-③	フルオロウラシル注 生理食塩液	2400mg/m ² mL*	46時間持続静注 バクスターインフューザーSV2.5	→			

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

【注1】オキサリプラチンは必ず5%ブドウ糖で希釈。(薬効がおちる。)

【注2】デキサート注は6.6~19.8mgで選択可。

【注3】オキサリプラチンのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。
(現在は4~16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)