

科名 外科
 対象疾患名 切除不能再発食道癌
 プロトコール名 PTX(食道癌)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	・・・	8	・・・	15	・・・	22	・・・	29	・・・	36	・・・	49
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残ハキ可	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
2	点滴注	側管	デキサート注	6.6mg	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
			ファモチジン注	20mg														
			生食	50mL														
3	点滴注	側管	ネオレスタール注	10mg	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
			生食	50mL														
4	点滴注	側管	パクリタキセル注	100mg/m ²	1時間かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
			生食	250mL														

★1クール＝49日

～MEMO～

・催吐レベル2(30～10%)

<パクリタキセル>

初回デキサート13.2mgへ増量。

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

薬剤特徴(末梢静脈投与時):1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)