

科名 外科

対象疾患名 HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発胃癌

プロトコール名 エンハーツ(胃癌)(アロカリス併用)

| Rp | 形態  | ルート | 薬品名                          | 投与量                       | 時刻・コメント                                   | 1 | ... | 21 |
|----|-----|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---|-----|----|
| 1  | 点滴注 | メイン | 5%ブドウ糖                       | 250mL                     | ルートキープ<br>残破棄可                            | ↓ |     |    |
| 2  | 点滴注 | 側管  | パロノセトロンバッグ<br>アロカリス<br>デキサート | 0.75mg<br>235mg<br>4.95mg | 30分かけて                                    | ↓ |     |    |
| 3  | 点滴注 | 側管  | エンハーツ<br>注射用水<br>5%ブドウ糖      | 6.4mg/kg<br>5mL<br>100mL  | 初回90分、忍容性あれば2回目以降30分<br>要遮光 調製後4時間以内に投与終了 | ↓ |     |    |

★1クール=21日

## ～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～4にデキサメタゾン錠を朝、昼食後に4mg/回

〈エンハーツ〉

間質性肺炎の発生頻度が高いため注意すること。

調製時及びルートの遮光は不要