

科名 外科  
 対象疾患名 乳がん  
 プロトコール名 ddEC(アロカリス併用)

| Rp | 形態  | ルート | 薬品名       | 投与量                  | 時刻・コメント | 1 | ... | 3 | ... | 15 | ... | 14 |
|----|-----|-----|-----------|----------------------|---------|---|-----|---|-----|----|-----|----|
| 1  | 点滴注 | メイン | 生食        | 500mL                | ルートキープ  | ↓ |     |   |     |    |     |    |
| 2  | 点滴注 | 側管  | グラニセロンバッグ | 1mg                  | 30分かけて  | ↓ |     |   |     |    |     |    |
|    |     |     | アロカリス     | 235mg                |         |   |     |   |     |    |     |    |
|    |     |     | デキサート     | 9.9mg                |         |   |     |   |     |    |     |    |
|    |     |     | 又は        |                      |         |   |     |   |     |    |     |    |
| 3  | 点滴注 | 側管  | パロノセロンバッグ | 0.75mg               | 30分かけて  |   |     |   |     |    |     |    |
|    |     |     | アロカリス     | 235mg                |         |   |     |   |     |    |     |    |
|    |     |     | デキサート     | 9.9mg                |         |   |     |   |     |    |     |    |
| 4  | 点滴注 | 側管  | エンドキサン    | 600mg/m <sup>2</sup> | 30分かけて  | ↓ |     |   |     |    |     |    |
|    |     |     | 生食        | 100mL                |         |   |     |   |     |    |     |    |
| 5  | 点滴注 | 側管  | 塩酸エピルビシン  | 90mg/m <sup>2</sup>  | 全開で     | ↓ |     |   |     |    |     |    |
|    |     |     | 生食        | 100mL                |         |   |     |   |     |    |     |    |
| 6  | 皮下注 |     | ジーラスタ     | 3.6mg                |         |   |     | ↓ |     |    |     |    |

★1クール=14日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

エピルビシンは蓄積性の心毒性があるため総投与量は900mg/m<sup>2</sup>以下とする。

再発リスクが高く、かつ十分な骨髄機能を有する患者を対象とする。