

科名 外科-129

対象疾患名 乳癌

プロトコール名 ddPTX

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3		14
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ	↓				
2	点滴注	側管	ファモチジン注	20mg	30分かけて	↓				
			デキサート注	19.8mg						
			生食	50mL						
3	点滴注	側管	ネオレスタール注	10mg	30分かけて	↓				
			生理食塩液	50mL						
4	点滴注	側管	パクリタキセル	175mg/m ²	必ず3時間かけて	↓				
			生理食塩液	500mL						
5	皮下注		ジーラスタ	3.6mg				↓		

★1クール=14日

～MEMO～

催吐レベル2(10%以上30%未満)

＜パクリタキセル＞

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

末梢静脈から投与する場合は薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

再発リスクが高く、かつ十分な骨髄機能を有する患者を対象とする。