

科名 外科

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 Cmab(biweekly)+FOLFIRI(アロカリス併用)

| Rp | 形態    | ルート | 薬品名                                     | 投与量                                  | 時刻・コメント                       | 1 | ・・・ | ・・・ | 14 |
|----|-------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----|-----|----|
| 1  | CVポート | メイン | 生理食塩水                                   | 500mL                                | ルートキープ                        | ↓ |     |     |    |
| 2  | CVポート | 側管  | パロノセトロンバッグ<br>アロカリス<br>デキサート<br>ネオレスタール | 0.75mg<br>235mg<br>4.95mg<br>10mg    | 30分かけて                        | ↓ |     |     |    |
| 3  | CVポート | 側管  | アービタックス<br>生理食塩液                        | 500mg/m <sup>2</sup><br>250mL        | 2時間かけて                        | ↓ |     |     |    |
| 4  | CVポート | メイン | レボホリナート<br>生理食塩水                        | 200mg/m <sup>2</sup><br>250mL        | 2時間かけて                        | ↓ |     |     |    |
| 5  | CVポート | 側管  | カンプト(CPT11)<br>生理食塩水                    | 150 or 180mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 2時間かけて                        | ↓ |     |     |    |
| 6  | CVポート | 側管  | フルオロウラシル<br>生理食塩水                       | 400mg/m <sup>2</sup><br>50mL         | 全開で                           | ↓ |     |     |    |
| 7  | CVポート | メイン | フルオロウラシル<br>生理食塩水                       | 2400mg/m <sup>2</sup><br>mL※         | 46時間持続静注<br>バクスターインフューザーSV2.5 | ↓ |     |     |    |

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

★1クール＝14日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

- ・ アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。
  - ・ アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。
  - ・ アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。
  - ・ アービタックス使用にあたっては、EGFR陽性を確認する検査を実施すること。