

科名 外科

対象疾患名 結腸・直腸癌(切除不能または再発)

プロトコール名 Cmap(biweekly)+IRIS(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	コメント	1	...	...	15	...	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓			↓			
2	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて	↓			↓			
			アロカリス	235mg								
			デキサート	4.95mg								
			ネオレスタール	10mg								
3	点滴注	側管	アービタックス	500mg/m ²	2時間かけて	↓			↓			
			生食	250mL								
4	点滴注	側管	カンプト	100mg/m ²	90分以上かけて	↓			↓			
			生食	500mL								

経口 TS-1 1回40~60mg/m²を1日2回 d1~d14投与、d15~d28は休薬

★1クール=28日、

~MEMO~

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4とday16-18にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

<アービタックス>

アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。

アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。

アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。

アービタックス使用にあたってはEGFR陽性、KRAS遺伝子の野生型を確認する検査を実施すること。

<S-1>

・S-1は 14日間投与、14日間休薬

・S-1は 体表面積(BSA)<1.25m²:40mg/回1.25m²≤BSA<1.5m²:50mg/回BSA≥1.5m²:60mg/回