

科名 外科

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 Cmab(biweekly)+FOLFIRI

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	14
1	CVポート	メイン	生理食塩水	500mL	ルートキープ	↓			
2	CVポート	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて	↓			
			デキサート	9.9mg					
			ネオレスタール	10mg					
3	CVポート	側管	アービタックス	500mg/m ²	2時間かけて	↓			
			生理食塩液	250mL					
4	CVポート	メイン	レボホリナート	200mg/m ²	2時間かけて	↓			
			生理食塩水	250mL					
5	CVポート	側管	カンプト	150 or 180mg/m ²	2時間かけて	↓			
			生理食塩水	250mL					
6	CVポート	側管	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開で	↓			
			生理食塩水	50mL					
7	CVポート	メイン	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注46時間	↓			
			生理食塩水	mL [※]	バクスターインフューザーSV2.5				

※生理食塩液の量はフルオロウラシルの量により決定する。

★1クール=14日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

- ・ アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。
- ・ アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。
- ・ アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。
- ・ アービタックス使用にあたっては、EGFR陽性を確認する検査を実施すること。