

科名 外科 外43(b)

対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌

プロトコール名 C-mab+FOLFIRI(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	.....	8	.....	14
1	CVポート	メイン	生理食塩水	500mL	ルートキープ	↓		↓		
2	CVポート	側管	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート ネオレスタール	0.75mg 235mg 6.6mg 10mg	30分かけて	↓				
3	CVポート	側管	生理食塩水 デキサート注 ネオレスタール	50mL 6.6mg 10mg	30分かけて			↓		
4	CVポート	側管	アービタックス 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 250mL	医師の指示通り	↓				
4	CVポート	側管	アービタックス 生理食塩液	250mg/m <sup>2</sup> 250mL	医師の指示通り			↓		
5-①	CVポート	メイン	レボホリナート 生理食塩水	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	2時間かけて			↓		
5-②	CVポート	側管	カンプト(CPT11) 生理食塩水	150 or 180mg/m <sup>2</sup> 250mL	2時間かけて			↓		
6	CVポート	側管	フルオロウラシル 生理食塩水	400mg/m <sup>2</sup> 50mL	全開で			↓		
7	CVポート	メイン	フルオロウラシル 生理食塩水	2400mg/m <sup>2</sup> mL <sup>*</sup>	46時間持続静注 バクスターインフューザーSV2.5			↓		

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

★1クール=14日

~MEMO~

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

- ・ アービタックスの初回投与量は400mg/m<sup>2</sup>を2時間かけて、2回目以降は250mg/m<sup>2</sup>を1時間かけて点滴静注する。
- ・ アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。
  - ・ アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。
  - ・ アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。
  - ・ アービタックス使用にあたっては、EGFR陽性を確認する検査を実施すること。