

科名 消化器科
 対象疾患 胃がん
 プロトコール名 HER+SOX(胃癌)初回

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	15	...	22
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓	↓				
2	点滴注	側管	トラスツズマブ	8mg/kg	90分かけて	↓					
			注射用水	7.2mL							
			生食	250mL							
3	点滴注	側管	アロキシバッグ	0.75mg	30分かけて		↓				
			デキサート	9.9mg							
			ファモチジン	20mg							
			ネオレスタール	10mg							
4	点滴注	側管	オキサリプラチン	100mg/m ²	2時間かけて		↓				
			5%ブドウ糖液	500mL	ルートごと変更						
内服 S-1 1回40mg～60mgを1日2回 d2～d15投与、d16～d22は休薬 ★1クール＝22日											

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day3～5にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

<トラスツズマブ>

初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg。初回90分で忍容性があれば2回目以降30分。

ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性あれば30分。

禁忌: アンスラサイクリン系との併用(心毒性の増強)

初回投与の40%にインフュージョンリアクションが認められる。投与開始後2時間は慎重に観察

三か月毎に心エコーで心機能を評価

最終投与から3か月以上経過した場合は初回投与量(8mg/kg)より再開する。

<S-1>

14日間投与、7日間休薬

・体表面積(BSA)<1.25m²:40mg/回

1.25m²≤BSA<1.5m²:50mg/回

BSA≥1.5m²:60mg/回

<オキサリプラチン>

オキサリプラチンは必ず5%ブドウ糖で希釈。(薬効がおちる。)

オキサリプラチンのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。(現在は

4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)

・デキサートは6.6、9.9、13.2、19.8mgで選択可。