科名　　外科

対象疾患　　胃癌術後

プロトコール名　　S-1+weeklyDOC

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ・・・ 8 ・・・ 21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残ハキ可	↓ ↓
2	点滴注	側管	デキサート注	6.6mg	30分かけて	↓ ↓
			生理食塩液	50mL		
3	点滴注	側管	ネオレスタール	10mg	30分かけて	↓ ↓
			生理食塩液	50mL		
4	点滴注	側管	ドセタキセル	40mg/㎡	1時間かけて	↓ ↓
			生理食塩液	250mL	壊死性抗がん剤	
5	内服		S-1 1回40～60mgを1日2回　day1～14投与、day15～21は休薬			

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル2（10～30%）

7コースまで（1コース目はS-1単独投与）

1コース目はS-1単剤で2週投与1週休薬し2コース目よりドセタキセルを追加する。

＜ドセタキセル＞

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返す。

ｱﾚﾙｷﾞｰ好発時期:初回、2回目

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にする。

（1hrで滴下する場合126滴/分）

＜S-1＞

S-1は2週投与1週休薬

体表面積（BSA）＜1.25㎡:40mg/回

1.25㎡≦BSA＜1.5㎡:50mg/回

BSA≧1.5㎡:60mg/回

Addition of Docetaxel to Fluoropyrimidine Improves Efficacy in Patients With StageⅢ Gastric Cancer:Interim Analysis of JACCRO GC-',a Randomized Contorolled Trial
J Clin Oncol 37.