

科名 外科  
 対象疾患名 乳がん  
 プロトコール名 ddEC(day1ジーラスタボディポッド併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	3	...	15	...	14
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ	↓						
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓						
			アロカリス	235mg								
			デキサート	9.9mg								
			又は									
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて							
			アロカリス	235mg								
			デキサート	9.9mg								
4	点滴注	側管	エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>	30分かけて	↓						
			生食	100mL								
5	点滴注	側管	塩酸エピルビシン	90mg/m <sup>2</sup>	全開で	↓						
			生食	100mL								
6	皮下注		ジーラスタボディポッド	3.6mg		↓						
7	皮下注		生食	20mL	ボディポッドプライミング用	↓						

★1クール=14日

~MEMO~

催吐レベル4(90%以上)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

エピルビシンは蓄積性の心毒性があるため総投与量は900mg/m<sup>2</sup>以下とする。

再発リスクが高く、かつ十分な骨髄機能を有する患者を対象とする。

<ジーラスタボディポッド>

電源起動後約27時間後に自動的に薬液の投与が開始される。(投与時間は約24分)