

科名 外科
対象疾患 食道癌
プロトコール名 キイトルーダ+FP

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	...	22
1	CV	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22時から10時 ※アリメバッグ	↓							
2	CV	側管	キイトルーダ 生食	200mg 100mL	9時から9時30分	↓							
3	CV	側管	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート注	0.75mg 235mg 9.9mg	9時30分から10時	↓							
4	CV	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9時30分から10時			↓	↓	↓			
5	CV	側管	シスプラチン注 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	10時から12時	↓							
6	CV	メイン	フルオルウラシル 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	400mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10時から22時 ※アリメバッグ	↓							
7	CV	メイン	フルオルウラシル 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	400mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	22時から～10時 ※アリメバッグ	↓							
8	CV	メイン	フルオルウラシル 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	800mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10時から10時 ※アリメバッグ			↓	↓	↓	↓		
9	点滴注	側管	マンニトールS	300mL	10時から12時	↓							

★1クール＝22日間

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

6コースまで

<キイトルーダ>

本剤作用機序により、過度の免疫反応による副作用が現れることがある。発現した事象に応じた専門医と連携すること。

特に注意を要する副作用:間質性肺疾患、大腸炎、重度の下痢、肝炎、神経障害、副腎障害、重度の皮膚障害

infusion reaction、重症筋無力症、筋炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、腎障害、脳炎、静脈血栓症

インラインフィルター(0.2または0.22ミクロン)を使用し、投与前後に生食でフラッシュする。