

科名 外科

対象疾患名 1-2レジメンの化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

レジメン名 ダトロウェイ

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	…	21
1	点滴注	メイン	5%ブドウ糖	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓		
2	点滴注	側管	パロノセトロン	0.75mg	30分かけて	↓		
			アロカリス	235mg				
			ポララミン	5mg				
			デキサート	4.95mg				
3	点滴注	側管	アセリオ	500mg	15分かけて	↓		
4	点滴注	側管	ダトロウェイ	6mg/kg	初回90分2回目以降認容性良好であれば30分	↓		
			注射用水	5mL	室温では調製から4時間以内に投与完了。			
			5%ブドウ糖	100mL				

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day3,4にテガドロン錠を朝,昼食後に4mg/回

アントラサイクリン系薬剤、およびタキサン系抗がん剤の使用歴のある患者に使用すること。

眼症状に対してコンタクトレンズ使用避ける。ソフトサンティア等の頻回の使用。

口内炎に対して洗口液の使用