

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 非小細胞肺がん
 プロトコール名 PEM+CDDP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	・・・	21
1	点滴注	メイン④-1	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓				
2	点滴注	側管①	生食	500mL	120分かけて	↓				
			硫酸マグネシウム	20mL						
3	点滴注	側管②	ソルデム3A	500mL	120分かけて	↓				
4	点滴注	側管④	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓				
			アロカリス	235mg						
			デキサート	9.9mg						
			又は							
5	点滴注	側管④	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて					
			アロカリス	235mg						
			デキサート	9.9mg						
6	点滴注	側管⑤	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分かけて	↓				
			生食	100mL						
7	点滴注	側管⑥	シスプラチン	75mg/m ²	120分かけて	↓				
			生食	250mL						
8	点滴注	側管⑦	生食	500mL	120分かけて	↓				
9	点滴注	側管⑧	マンニトールS	300mL	60分かけて	↓				
10	点滴注	メイン④-2	ソルデム3A	500mL	120分かけて	↓				
11	点滴注	メイン④-3	ソルデム3A	500mL	120分かけて	↓				
12	点滴注	メイン④-4	ソルデム3A	500mL	120分かけて	↓				
13	点滴注	メイン	生食	100mL	30分かけて		↓	↓		
			デキサート	6.6mg						
			プリンペラン	20mg						
14	点滴注	メイン	生食	500mL	120分かけて		↓	↓		
15	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	120分かけて		↓	↓		
16	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	120分かけて		↓	↓		

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

day0にデカドロン1回8mgを1日2回内服

<ペメトレキセド>

NSAIDsと併用注意

副作用予防のため必ず葉酸とビタミンB12を組み合わせる。

葉酸: フォリアミン0.5mg/dayはペメトレキセド投与7日前～最終投与後22日目まで毎日投与。

ビタミンB12: メチコパール注500μgを2Aペメトレキセド投与7日前～最終投与後22日目まで9週毎(3コースごと)