

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 非小細胞がん(非扁平上皮がん)
 プロトコール名 PEM+CBDCA(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓						
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓						
			アロカリス	235mg								
			デキサート	4.95mg								
			又は									
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて							
			アロカリス	235mg								
			デキサート	4.95mg								
4	点滴注	側管	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分かけて	↓						
			生食	100mL								
5	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC5~6	1時間かけて	↓						
			生食	250mL								

★1クール=21日

~MEMO~

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2にデカドロン1回2mgを1日2回朝、昼食後に内服。(4mg/day)

day3,4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

<ペメトレキセド>

NSAIDsと併用注意

副作用予防のため必ず葉酸とビタミンB12を組み合わせる。

葉酸:フォリアミン0.5mg/dayはペメトレキセド投与7日前~最終投与後22日目まで毎日投与。

ビタミンB12:メチコバール注500μgを2Aペメトレキセド投与7日前~最終投与後22日目まで9週毎(3コースごと)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5~6=5~6x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降