

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 非小細胞肺癌
 プロトコール名 CDBCA+VNR

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ	↓		↓				
2	点滴注	側管	グラニセロン1mg/バッグ	100mL	30分かけて	↓						
			デキサート	9.9mg								
			又は									
3	点滴注	側管	パロノセトロン	0.75mg	30分かけて							
			デキサート	9.9mg								
4	点滴注	側管	デキサート	6.6mg	30分かけて			↓				
			生食	50mL								
5	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC4~6	30分かけて	↓						
			生食	250mL								
6	点滴注	側管	ロゼウス	20mg/m ²	全開で	↓		↓				
			生食	50mL								

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～3にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

<ロゼウス>

ロゼウスは全開投与し、終了後メインの生食を250mL全開で落とす。

<カルボプラチン>

カルボプラチンの投与量: AUC4~6=4~6×(Ccr+25)

8回目以降の投与ではアレルギー症状を起こしやすいので注意すること。