

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 非小細胞肺癌
 プロトコール名 CBDCA+S-1

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓						
2	点滴注	側管	グラニセトロン1mg/バッグ	3mg	30分かけて	↓						
			デキサート	9.9mg								
			又は									
3	点滴注	側管	パロノセトロン	0.75mg	30分かけて							
			デキサート	9.9mg								
4	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC6	30分かけて	↓						
			生食	250mL								
5	内服	TS-1 1回 40~60mg/回を1日2回。day1~14まで内服										

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

<カルボプラチン>

カルボプラチンの投与量: $AUC6 = 6 \times (Ccr + 25)$

8回目以降の投与ではアレルギー症状を起こしやすいので注意すること。

<TS-1>

・TS-1は 14日間投与、7日間休薬

・TS-1は 体表面積(BSA) < $1.25m^2$: 40mg/回

$1.25m^2 \leq BSA < 1.5m^2$: 50mg/回

$BSA \geq 1.5m^2$: 60mg/回