

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 非小細胞がん
 プロトコール名 weeklyPTX+CBDCA

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	…	8	…	15	…	28
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	グラニセトロン デキサート ファモチジン	1mg 9.9mg 20mg	30分かけて	↓						
	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ デキサート ファモチジン	0.75mg 9.9mg 20mg	30分かけて							
2	点滴注	側管	デキサート ファモチジン 生食	6.6mg 20mg 50mL	30分かけて	↓		↓				
3	点滴注	側管	ポララミン 生食	5mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		
4	点滴注	側管	パクリタキセル 生食	60mg/m ² 250mL	60分かけて	↓		↓		↓		
5	点滴注	側管	カルボプラチニ 生食	AUC6 250mL	30分かけて	↓						

★1クール=28日

～MEMO～

day1は催吐レベル3(30%以上90%未満)、day8,15は催吐レベル2(10%以上30%未満)

day2～4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

〈パクリタキセル〉

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例、アルコール含有、アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回、2回目(投与開始から10分間はベッドサドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

末梢静脈から投与する場合は薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

〈カルボプラチニ〉

カルボプラチニの投与量:AUC6=6×(Ccr+25)

8回目以降の投与ではアレルギー症状を起こしやすいので注意すること。