

科名 泌尿器科-1
 対象疾患名 尿路上皮癌
 プロトコール名 MVAC

泌尿1

泌尿-1

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	…	15	…	22	…	28
1	点滴注	メイン	ソリアセトD	2000mL												
2	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注	0.75mg 3.3~19.8mg	30分かけて											
3	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	30分かけて											
4	点滴注	側管	メソトレキセート注 ソルデム3A	30mg/m ² 200mL	2時間かけて											
5	静注	側管	ロイコボリン注	9mg	3時間ごと											
6	静注	側管	ロイコボリン注	9mg	3時間ごと											
7	静注	側管	ロイコボリン注	9mg	3時間ごと											
8	静注	側管	エクザール注 生理食塩液	3mg/m ² 20mL												
9	静注	側管	ドキシソルピシン注 生理食塩液	30mg/m ² 20mL												
10	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	70mg/m ² 250mL	3時間かけて											
11	静注	側管	ラシックス注	20mg	シスプラチン終了後											
12	点滴注	メイン	ソリアセトD	1500mL												
13			メイロン	40mL												
14	静注	側管	エクザール注 生理食塩液	3mg/m ² 20mL												
15	点滴注	側管	メソトレキセート注 ソルデム3A	30mg/m ² 200mL	2時間かけて											
16	静注	側管	ロイコボリン注	9mg	3時間ごと											
17	静注	側管	ロイコボリン注	9mg	3時間ごと											
18	静注	側管	ロイコボリン注	9mg	3時間ごと											

1クール = 28日

~ MEMO ~

・催吐レベル4 (90%以上)

・エクザール注は1mg/1mLになるように調製する。