

科名 泌尿器科
 対象疾患名 前立腺がん
 プロトコール名 ジェブタナ

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓						
2	点滴注	側管	デキサート ファモチジン 生食	6.6mg 20mg 50mL	30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	ネオレスタール 生食	10mg 50mL	30分かけて	↓						
4	点滴注	側管	ジェブタナ 生食	20 or 25mg/m ² 250mL	90分かけて 壊死性抗がん剤 要フィルター	↓						
5	皮下注		ジーラスタ	3.6mg				↓				
6	内服		プレドニゾン	1回10mgを1日1回朝食後	連日投与							

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル2(10%以上30%未満)

<ジェブタナ>

0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。

CYP3Aを強く阻害する薬剤の併用は避けること。

発熱性好中球減少症が多い(54.5%:国内第I相試験)ためday5に採血し、好中球数を確認し、G-CSFの投与を考慮すること。

<ジーラスタ>

化学療法剤投与終了後の翌日以降(24時間以降)に投与

がん化学療法剤の投与終了後72時間を超えてからのG-CSF製剤の投与は

G-CSF製剤未投与と比較して発熱発症割合や抗生剤投与期間等に差は見られなかった。