

科名 泌尿器科
 対象疾患名 尿路上皮がん
 プロトコール名 CDDP-XRT

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 21 |
|----|-----|-----|---------------------|------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン | ソルアセトD | 500mL | キープ 80mL/h | ↓ | ↓ | | | | | |
| 2 | 点滴注 | メイン | ソルアセトD | 500mL | キープ 80mL/h | ↓ | ↓ | | | | | |
| 3 | 点滴注 | メイン | ソルアセトD | 500mL | キープ 80mL/h | ↓ | ↓ | | | | | |
| 4 | 点滴注 | メイン | ソルアセトD | 500mL | キープ 80mL/h | ↓ | ↓ | | | | | |
| 5 | 点滴注 | 側管 | パロノセトロンバッグ デキサート | 0.75mg 6.6mg | 30分かけて | ↓ | | | | | | |
| 6 | 点滴注 | 側管 | シスプラチン 生食 | 70mg/m ² 500mL | 2時間かけて | ↓ | | | | | | |
| 7 | 静注 | 側管 | ラシックス | 20mg | シスプラチン投与後 | ↓ | | | | | | |

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

day2にデカドロン錠を朝、昼食後に1回2mg(4錠)内服、

day3,4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。