

科名 泌尿器科14(1')
 対象疾患名 再燃前立腺がん
 プロトコール名 DEC(day1~14)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	14
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残ハキ可	↓		↓		
2	点滴注	側管1	パロノセトロンバッグ デキサート	0.75mg 6.6~19.8mg	30分かけて	↓				
2	点滴注	側管1	生理食塩液 デキサート	50mL 6.6~19.8mg	30分かけて			↓		
3	点滴注	側管2	生理食塩液 クロール・トリメトン	50mL 10mg	30分かけて	↓		↓		
4	点滴注	側管3	ドセタキセル 生理食塩液	30mg/m ² 250mL	1時間かけて ※壊死性抗がん剤	↓		↓		
5	点滴注	側管4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=6 250mL	2時間かけて	↓				
6	内服		エストラサイト	10mg/kg/day	day1-28	↓	↓	↓	↓	↓

★1クール=35日

~MEMO~

・day1は催吐レベル3~4(30~90%以上)イメンドの併用も考慮。

・day8は催吐レベル2(30~10%)

<ドセタキセル>

ドセタキセルの溶解は添付溶解液を使用せず、生食or5%Gで行うこと。

初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。

ドセタキセル投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にすること。

(1hrで滴下する場合126滴/分)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC2=2x(Ccr+25) CCrはchatelut式を使用

アレルギー好発時期:8回目以降