

科名 泌尿器科 泌尿-22  
 対象疾患名 尿管癌  
 プロトコール名 M-FAP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	15	...	28
1	点滴注	メイン	ソルアセトD	500mL		↓	↓	↓						↓
2	点滴注	メイン	ソルアセトD	500mL		↓	↓	↓						↓
3	点滴注	メイン	ソルアセトD	500mL		↓	↓	↓						↓
4	点滴注	メイン	ソルアセトD	500mL		↓	↓	↓						
5	静注	側管	メイロン注	40mL		↓								↓
6	点滴注	側管	デキサート注 グラニセトロン注	9.9mg 1mg	30分かけて	↓	↓	↓						↓
7	点滴注	側管	メソレキセート注 ソルデム3A	30mg/m <sup>2</sup> 200mL	2時間かけて	↓								↓
8	点滴注	側管	エピルビシン注 生食	50mg/m <sup>2</sup> 50mL	全開で	↓								
9	静注	側管	ロイコボリン	9mg	3時間ごと	↓								↓
10	静注	側管	ロイコボリン	9mg	3時間ごと	↓								↓
11	静注	側管	ロイコボリン	9mg	3時間ごと	↓								↓
13	点滴注	側管	デキサート注 生食	9.9mg 50mL	30分かけて					↓	↓			
14	点滴注	側管	シスプラチン注 生食	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	3時間かけて		↓	↓						
15	点滴注	側管	マンニトールS	300mL	1時間かけて		↓	↓						
16	点滴注	側管	5-FU注 生食	700mg/m <sup>2</sup> 500mL	3時間かけて		↓	↓	↓					

★1クール=28日

～MEMO～

- ・メソレキセート 催吐レベル3(30～90%)
- ・エピルビシン 催吐レベル3(30～90%)
- ・シスプラチン 催吐レベル4(>90%)
- ・イメンド併用 d1朝から