

科名 泌尿器科

泌尿器科25

対象疾患名 尿膜管癌

プロトコール名 S-1+CDDP療法

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	9	10	11	...	35
1	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	6:00~8:00			↓					
2	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	8:00~10:00			↓					
3	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	ルートキープ シスプラチン後まで			↓					
4	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 9.9mg	10:30~11:00			↓					
5	点滴注	側管	シスプラチン 生食	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	2時間かけて 11:00~13:00			↓					
6	静注	側管	ラシックス注	20mg	シスプラチン後			↓					
7	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	13:00~16:00			↓					
8	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	16:00~19:00			↓					
9	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	19:00~22:00			↓					
10	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	8:00~10:00				↓	↓			
11	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	10:00~12:00				↓	↓			
12	点滴注	側管	デキサート 生食	3.3mg 50mL	30分かけて 10:00~10:30				↓				
13	点滴注	側管	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて 10:00~10:30					↓			
14	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	12:00~14:00				↓				
15	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	14:00~16:00				↓				
16	点滴注	メイン	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて 10:00~10:30							↓	
内服 S-1を1回40mg/m <sup>2</sup> を1日2回 d1朝食後~d21夕食後投与、d22朝食後~d35は休薬													

★1クール=35日

~MEMO~

催吐レベル4(90%以上)

S-1は21日間内服14日間休薬

S-1は1日2回内服、1回の投与量

体表面積(BSA) < 1.25m<sup>2</sup>は40mg/回1.25m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5m<sup>2</sup>は50mg/回BSA ≥ 1.5m<sup>2</sup>は60mg/回