

科名 泌尿器科 泌-21
 対象疾患 切除不能転移性腎細胞癌
 プロトコール名 トーリセル(テムシロリムス)

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | コメント | 1 | | 7 |
|----|-----|-----|-------------------|---------------|--|---|-------|---|
| 1 | 点滴注 | メイン | 生理食塩液 | 250mL | ルートキープ | ↓ | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 50mL | 30分かけて | ↓ | | |
| 3 | 点滴注 | 側管 | ネオレスタール注 生理食塩液 | 10mg 50mL | 30分かけて | ↓ | | |
| 4 | 点滴注 | 側管 | トーリセル注 生理食塩液 | 25mg 250mL | ルートキープの生食で フラッシュ後 30～60分かけて 専用ルート使用 | ↓ | | |

★1クール=7日

～MEMO～

- ・催吐レベル1(10%以下)
- ・本剤の投与は重度のinfusion reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行った上で開始すること。
- ・本剤投与中は毎回患者の状態に充分注意し、投与開始後はバイタルサインのモニタリングを行う。
- ・重度のinfusion reactionが認められた場合は直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・トーリセルは専用ルート(孔径5μm以下のインラインフィルター付、DEHPフリー)を使用のこと
- ・調製方法
 トーリセルは、過量充填されている!!
 1バイアルに添付希釈用液1.8mLを加え、よく振り混和する。気泡がおさまるまで待つ。
 (トーリセルを直接、生食で希釈しないこと)
 希釈した液から2.5mLを抜き取り、生食に混和する。混和する際激しく振盪しないこと。
- ・調製後6時間以内に投与を終了すること。