

科名 消化器科

対象疾患名 肝がん

プロトコール名 アイエーコール+5FU(動注)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 全て投与	↓						
2	点滴注	側管	ソルデム1	500mL	2時間かけて	↓						
3	点滴注	側管	プロイメンド 生食	150mg 100mL	30分かけて	↓						
4	点滴注	側管	グラニセトロン デキサート	1mg 9.9mg	30分かけて	↓						
5	肝動注	メイン	アイエーコール 生食	65mg/m <sup>2</sup> 50mL	20～40分かけて	↓						
6	肝動注	メイン	5-FU 生食	250mg 45mL	5時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
7	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて	↓						
8	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて	↓						
9	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて	↓						
10	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて	↓						

★1クール=28日

～MEMO～

5FUは250mg/dayをシリンジポンプを使用し、5時間で5日間連続投与

<腎障害軽減のため>

投与時から投与終了後1500～3000mLの適当な輸液を6時間以上かけて投与する。

尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

<調製>

アイエーコールを速やかに溶解するため調製時には湯浴(約50度)で加温した生食を加えて強く振り混ぜる。

アイエーコール100mg(70mL)を20mLのロック式シリンジで2～3本で調製する。

5FU250mg(5mL)+生食45mLを50mLのシリンジで調製する。