

科名 消化器科
対象疾患名 胃がん
プロトコール名 Triweekly nab-PTX

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓		
2	点滴注	側管	プロイメンド	150mg	30分かけて	↓		
			生食	100mL				
2	点滴注	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて	↓		
			デキサート注	4.95mg				
3	点滴注	側管	アブラキサン注	260、220、180mg/m ²	30分かけて	↓		
			生食	1VIに付20mL	壊死性抗がん剤 フィルター使用不可			

★1クール＝21日

～MEMO～

・ 催吐レベル2(10～30%)

＜アブラキサン＞

本剤は特定生物由来製品（血液製剤）のため、同意書およびLot番号管理が必要である。

他の薬剤との配合または同じ静注ラインでの同時注入は避ける。

5mg/mLとなるように調製し、総投与量をラベルに赤字で記載する。

小児用点滴ルート(JY-ND363PL)を使用。ルート内に約8mL入るため実投与量から8mL引いた数値で点滴速度を合わせる。

インラインフィルターを使用しない。

投与前後にルートキープの生食でフラッシュ。