

科名 消化器科 消化器45
 対象疾患名 胃がん
 プロトコール名 Weekly nab-PTX(プロイメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	28
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	プロイメンド	150mg	30分かけて	↓		↓		↓		
			生食	100mL								
2	点滴注	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて	↓		↓		↓		
			デキサート注	4.95mg								
3	点滴注	側管	アブラキサン注	100、80、60mg/m ²	30分かけて 壊死性抗がん剤	↓		↓		↓		
			生食	1Vに付20mL	小児用点滴ルート (JY-ND363PL)を使用 フィルター使用不可							

★1クール=28日

～MEMO～

- ・ 催吐レベル2(10～30%)

〈アブラキサン〉

本剤は特定生物由来製品（血液製剤）のため、同意書およびLot番号管理が必要である。

他の薬剤との配合または同じ静注ラインでの同時注入は避ける。

5mg/mLとなるように調製し、総投与量をラベルに赤字で記載する。

投与時に注射ラベルで総投与量を確認し、小児科用点滴ルート(JY-ND363PL)を使用。

投与量が少ないためルート内は出来るだけ入れきる。(目安:ルートの半分程度)

その際、滴下速度はそのままにする。(クレンメは全開にしない。)

インラインフィルターを使用しない。

投与前後にルートキープの生食でフラッシュ。

フツ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤を含む初回化学療法に不応となった進行・再発胃癌患者を対象としたABI-007(3週ごと投与)第Ⅱ相試験、社内資料、研究報告書No.384(2013)