

科名 消化器
対象疾患名 治癒切除不能な膵癌
プロトコール名 mFOLFIRINOX

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	14
1	CVポート	メイン5-①	プロイメンド 生食	150mg 100mL	30分かけて	↓			
2	CVポート	メイン5-②	アロキシバグ デキサート ファモチジン クロールトリメトン	0.75mg 4.95mg 20mg 10mg	30分かけて				
3	CVポート	メイン5-③	レボホリナート注 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
4	CVポート	側管①	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
5	CVポート	側管②	カンプト注 生理食塩液	150mg/m ² 250mL	2時間かけて	↓			
6	CVポート	メイン5-⑤	フルオロウラシル注 生理食塩液	2400mg/m ² mL※	46時間持続静注 バクスターインフューザーSV2.5	→			

※生理食塩液の量は5-FUの量により決定する。

1クール＝14日

～MEMO～

UGT1A1の遺伝子多型検査を実施し、ホモ接合体、ヘテロ接合体をもつ患者には投与しない。

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

1クール目は入院にて実施。

禁忌: 黄疸のある患者や胆管閉塞等の肝胆道系障害の疑われる患者

PSが2以上の患者

発熱性好中球減少症の発生頻度が高いため必要時G-CSFの投与を行うこと。

<エルフラット>

アレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。(現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)