

科名 消化器科 消化器49(a)

対象疾患 胃がん

プロトコール名 SOX(胃癌)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	14	...	21
1	点滴注 CV	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓				
2	点滴注 CV	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて	↓				
			デキサート注	9.9mg						
			ファモチジン	20mg						
			ネオレスタール	10mg						
			又は							
3	点滴注 CV	側管	アロキシバッグ	0.75mg	30分かけて					
			デキサート	9.9mg						
			ファモチジン	20mg						
			ネオレスタール	10mg						
4	点滴注 CV	側管	オキサリプラチン	100mg/m ²	2時間かけて	↓				
			5%ブドウ糖液	250mL又は500mL	ルートごと変更					
内服 S-1 1回40mg～60mgを1日2回 d1～d14投与、d15～d21は休薬										

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

<S-1>

14日間投与、7日間休薬

・体表面積(BSA)<1.25m²:40mg/回

1.25m²≤BSA<1.5m²:50mg/回

BSA≥1.5m²:60mg/回

<オキサリプラチン>

・必ず5%ブドウ糖液で希釈。(薬効がおちる。)

・アレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。

(現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)

・デキサートは6.6、9.9、13.2、19.8mgで選択可。

Phase III study comparing oxaliplatin plus S-1 with cisplatin plus S-1 in chemotherapy-naïve patients with advanced gastric cancer.

Ann Oncol.26(1):141-8,2015