

科名 消化器科 消化器49(b)

対象疾患 胃がん

プロトコール名 SOX(胃癌)(プロイメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	14	...	21
1	点滴注 CV	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓				
2	点滴注 CV	側管	プロイメンド 生食	150mg 100mL	30分かけて	↓				
3	点滴注 CV	側管	グラニセトロンバッグ デキサート注 ファモチジン ネオレスタール注 又は	1mg 9.9mg 20mg 10mg	30分かけて	↓				
4	点滴注 CV	側管	アロキシバッグ デキサート ファモチジン ネオレスタール注	0.75mg 9.9mg 20mg 10mg	30分かけて					
5	点滴注 CV	側管	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	100mg/m <sup>2</sup> 250mL又は500mL	2時間かけて ルートごと変更	↓				

内服 S-1 1回40mg～60mgを1日2回 d1～d14投与、d15～d21は休薬

★1クール＝21日

# ～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

<S-1>

14日間投与、7日間休薬

・体表面積(BSA)<1.25m<sup>2</sup>:40mg/回

1.25m<sup>2</sup>≤BSA<1.5m<sup>2</sup>:50mg/回

BSA≥1.5m<sup>2</sup>:60mg/回

<オキサリプラチン>

・必ず5%ブドウ糖液で希釈。(薬効がおちる。)

・アレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。

(現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)

・デキサートは6.6、9.9、13.2、19.8mgで選択可。