

科名 外科
 対象疾患名 胃癌
 プロトコール名 S-1+middledoseCDDP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	21	22	...	35
1	点滴注	メイン3-①	生食	500mL	制吐剤終了までルートキープ 残破棄可			↓		↓			↓		
2	点滴注	側管①	アロキシバッグ デキサート	0.75mg 9.9mg	30分かけて			↓		↓			↓		
3	点滴注	メイン3-②	フィジオ140	500mL	制吐剤終了後から 120分かけて			↓		↓			↓		
4	点滴注	側管②	シスプラチン 生食	25mg/m ² 500mL	120分かけて			↓		↓			↓		
6	点滴注	メイン3-③	フィジオ140 ラシックス	500mL 20mg	60分かけて			↓		↓			↓		
7	内服	S-1 1回40～60mgを1日2回day1夕～21朝投与、day21夕～36朝は休薬				↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		

★1クール=35日

MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

day8,15,22化学療法1時間前にイメンド125mg,その後2日間午前中に80mgを内服。

<S-1>

S-1は3週投与2週休薬

体表面積(BSA)<1.25m²:40mg/回

1.25m²≤BSA<1.5m²:50mg/回

BSA≥1.5m²:60mg/回